

# 逻辑学

杨睿之

复旦大学哲学学院

2023 年秋季

# 前情提要

- 三段论有效性的一种简化判定方法
  - 只需考虑  $\{\varphi, \psi, \neg\xi\}$  中有一个特称和两个全称命题的情况
  - $\{\varphi, \psi, \neg\xi\}$  若可满足, 存在论域中至多有一个对象的情况满足它
- 谓词逻辑: ( $n$  元) 谓词、常元、(存在、全称) 量词、命题连接词

# 谓词逻辑

自然语言到形式语言、机器语言的翻译和自然语言到自然语言的翻译类似，没有标准的程序

# 谓词逻辑

## 例 (量词的叠置)

- 所有人都有爱的人  $\forall x\exists yLxy$
- 有的人爱所有人  $\exists x\forall yLxy$
- 每个人都有人爱  $\forall x\exists yLyx$
- 有的人被所有人爱  $\exists x\forall yLyx$

# 谓词逻辑

## 例 (量词的叠置)

- 所有人都有爱的人  $\forall x\exists yLxy$
- 有的人爱所有人  $\exists x\forall yLxy$
- 每个人都有人爱  $\forall x\exists yLyx$
- 有的人被所有人爱  $\exists x\forall yLyx$

# 谓词逻辑

## 例 (量词的叠置)

- 所有人都有爱的人  $\forall x\exists yLxy$
- 有的人爱所有人  $\exists x\forall yLxy$
- 每个人都有人爱  $\forall x\exists yLyx$
- 有的人被所有人爱  $\exists x\forall yLyx$

# 谓词逻辑

## 例 (量词的叠置)

- 所有人都有爱的人  $\forall x\exists yLxy$
- 有的人爱所有人  $\exists x\forall yLxy$
- 每个人都有人爱  $\forall x\exists yLyx$
- 有的人被所有人爱  $\exists x\forall yLyx$

# 谓词逻辑

## 例 (量词的叠置)

- 所有人都有爱的人  $\forall x\exists yLxy$
- 有的人爱所有人  $\exists x\forall yLxy$
- 每个人都有人爱  $\forall x\exists yLyx$
- 有的人被所有人爱  $\exists x\forall yLyx$



# 谓词逻辑

## 例 (量词的叠置)

- 所有人都有爱的人  $\forall x\exists yLxy$
- 有的人爱所有人  $\exists x\forall yLxy$
- 每个人都有人爱  $\forall x\exists yLyx$
- 有的人被所有人爱  $\exists x\forall yLyx$

# 谓词逻辑

## 例 (量词的叠置)

- 所有人都有爱的人  $\forall x\exists yLxy$
- 有的人爱所有人  $\exists x\forall yLxy$
- 每个人都有人爱  $\forall x\exists yLyx$
- 有的人被所有人爱  $\exists x\forall yLyx$

# 谓词逻辑

## 例 (量词的叠置)

- 所有人都有爱的人  $\forall x\exists yLxy$
- 有的人爱所有人  $\exists x\forall yLxy$
- 每个人都有人爱  $\forall x\exists yLyx$
- 有的人被所有人爱  $\exists x\forall yLyx$

# 谓词逻辑

## 例 (量词的叠置)

- 所有人都有爱的人  $\forall x\exists yLxy$
- 有的人爱所有人  $\exists x\forall yLxy$
- 每个人都有人爱  $\forall x\exists yLyx$
- 有的人被所有人爱  $\exists x\forall yLyx$

# 谓词逻辑

- 注意，上面的例子中尽管出现了很多变元，但整个公式的意思是确定的（不依赖于  $x, y$  具体指什么）
- 尝试把  $L$  解释成自然数的  $>$ ，把  $\forall x$  理解成“所有自然数”，把  $\exists x$  理解成“存在自然数”，理解成“所有/存在实数”呢？
- 为了更精确的翻译，我们总是需要约定量词的论域（domain of discourse）

# 谓词逻辑

- 注意，上面的例子中尽管出现了很多变元，但整个公式的意思是确定的（不依赖于  $x, y$  具体指什么）
- 尝试把  $L$  解释成自然数的  $>$ ，把  $\forall x$  理解成“所有自然数”，把  $\exists x$  理解成“存在自然数”，理解成“所有/存在实数”呢？
- 为了更精确的翻译，我们总是需要约定量词的论域（domain of discourse）

# 谓词逻辑

- 注意，上面的例子中尽管出现了很多变元，但整个公式的意思是确定的（不依赖于  $x, y$  具体指什么）
- 尝试把  $L$  解释成自然数的  $>$ ，把  $\forall x$  理解成“所有自然数”，把  $\exists x$  理解成“存在自然数”，理解成“所有/存在实数”呢？
- 为了更精确的翻译，我们总是需要约定量词的 **论域**（domain of discourse）

# 谓词逻辑与自然语言

## 翻译三段论

- 所有  $A$  是  $B$ :  $\forall x(Ax \rightarrow Bx)$
- 所有  $A$  不是  $B$ :  $\forall x(Ax \rightarrow \neg Bx)$
- 有的  $A$  是  $B$ :  $\exists x(Ax \wedge Bx)$
- 有的  $A$  不是  $B$ :  $\exists x(Ax \wedge \neg Bx)$



# 谓词逻辑与自然语言

## 更多的谓词

### 每个男孩都爱一个女孩

- 每个男孩都有“爱一个女孩”这个性质：

$$\forall x(Bx \rightarrow \varphi(x))$$

- $\varphi(x)$  表示“ $x$  爱一个女孩”： $\exists y(Gy \wedge Lxy)$

- $\forall x(Bx \rightarrow \exists y(Gy \wedge Lxy))$

# 谓词逻辑与自然语言

## 更多的谓词

每个男孩都爱一个女孩

- 每个男孩都有“爱一个女孩”这个性质：

$$\forall x(Bx \rightarrow \varphi(x))$$

- $\varphi(x)$  表示“ $x$  爱一个女孩”： $\exists y(Gy \wedge Lxy)$

- $\forall x(Bx \rightarrow \exists y(Gy \wedge Lxy))$

# 谓词逻辑与自然语言

## 更多的谓词

每个男孩都爱一个女孩

- 每个男孩都有“爱一个女孩”这个性质：

$$\forall x(Bx \rightarrow \varphi(x))$$

- $\varphi(x)$  表示“ $x$  爱一个女孩”： $\exists y(Gy \wedge Lxy)$

- $\forall x(Bx \rightarrow \exists y(Gy \wedge Lxy))$

# 谓词逻辑与自然语言

## 更多的谓词

每个男孩都爱一个女孩

- 每个男孩都有“爱一个女孩”这个性质：

$$\forall x(Bx \rightarrow \varphi(x))$$

- $\varphi(x)$  表示“ $x$  爱一个女孩”： $\exists y(Gy \wedge Lxy)$

- $\forall x(Bx \rightarrow \exists y(Gy \wedge Lxy))$

# 谓词逻辑与自然语言

## 更多的谓词

每个男孩都爱一个女孩

- 每个男孩都有“爱一个女孩”这个性质：

$$\forall x(Bx \rightarrow \varphi(x))$$

- $\varphi(x)$  表示“ $x$  爱一个女孩”： $\exists y(Gy \wedge Lxy)$

- $\forall x(Bx \rightarrow \exists y(Gy \wedge Lxy))$

# 谓词逻辑与自然语言

## 更多的谓词

每个男孩都爱一个女孩

- 每个男孩都有“爱一个女孩”这个性质：


$$\forall x(Bx \rightarrow \varphi(x))$$

- $\varphi(x)$  表示“ $x$  爱一个女孩”： $\exists y(Gy \wedge Lxy)$

- $\forall x(Bx \rightarrow \exists y(Gy \wedge Lxy))$

# 谓词逻辑与自然语言

类似命题逻辑中的复合命题，复杂的谓词逻辑公式也可以分析其**构造树**。对复杂表达式的翻译也可以参考构造树



# 谓词逻辑与自然语言

例

No girl who loves a boy is not loved by some boy



# 谓词逻辑与自然语言

例

没有爱某个男孩的女孩不被某个男孩爱

# 谓词逻辑与自然语言

更多的量词跌置

例

You can fool some people all the time,  
and you can fool all the people some time,  
but you cannot fool all the people all the time.

# 谓词逻辑与自然语言

更多的量词跌置

例 (函数  $f$  在  $x$  上是连续的)

对任意正实数  $\varepsilon$ , 存在实数  $\delta$ , 对任意满足  $|x - y| < \delta$  的实数  $y$ , 有  $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$

接下来我们根据直观来观察一些谓词逻辑的 **推理**

# 一元谓词逻辑

**一元谓词逻辑** (Monadic Predicate Logic) 是谓词逻辑的一个片段 (fragment), 其中只包含一元谓词 (不包含常元、函数符号、二元或更多元谓词符号)

- 三段论可以翻译到一元谓词逻辑的语言中
- 我们可以用文恩图来帮助判断一元谓词逻辑推理是否有效

# 一元谓词逻辑

考虑下面的语句

- 有的  $A$  不是  $B$
- 并非所有  $A$  都是  $B$
- 所有  $A$  都不是  $B$
- 没有  $A$  是  $B$

# 一元谓词逻辑

考虑下面的语句

- $\exists x(Ax \wedge \neg Bx)$
- 并非所有  $A$  都是  $B$
- 所有  $A$  都不是  $B$
- 没有  $A$  是  $B$

# 一元谓词逻辑

考虑下面的语句

- $\exists x(Ax \wedge \neg Bx)$
- $\neg \forall x(Ax \rightarrow Bx)$
- 所有  $A$  都不是  $B$
- 没有  $A$  是  $B$



# 一元谓词逻辑

考虑下面的语句

- $\exists x(Ax \wedge \neg Bx)$
- $\neg \forall x(Ax \rightarrow Bx)$
- $\forall x(Ax \rightarrow \neg Bx)$
- 没有  $A$  是  $B$

# 一元谓词逻辑

考虑下面的语句

- $\exists x(Ax \wedge \neg Bx)$
- $\neg \forall x(Ax \rightarrow Bx)$
- $\forall x(Ax \rightarrow \neg Bx)$
- $\neg \exists x(Ax \wedge Bx)$

# 一元谓词逻辑

以上观察提示我们下面的等价下

- $\neg\forall x\varphi$  等价于  $\exists x\neg\varphi$
- $\neg\exists\varphi$  等价于  $\forall x\neg\varphi$

因而, 也有

- $\forall x\varphi$  等价于  $\neg\exists x\neg\varphi$
- $\exists\varphi$  等价于  $\neg\forall x\neg\varphi$

# 一元谓词逻辑

一元谓词逻辑比三段论“更多”

■  $\forall x(Ax \wedge Bx)$  与  $\forall xAx \wedge \forall xBx$  等价

$\forall$  可对  $\wedge$  分配

■  $\forall x(Gx \vee Bx)$  与  $\forall xGx \vee \forall xBx$  等价吗?

$\forall$  不对  $\vee$  分配

$\exists$  与  $\wedge$  和  $\vee$  呢?

# 一元谓词逻辑

一元谓词逻辑比三段论 “更多”

■  $\forall x(Ax \wedge Bx)$  与  $\forall xAx \wedge \forall xBx$  等价

$\forall$  可对  $\wedge$  分配

■  $\forall x(Gx \vee Bx)$  与  $\forall xGx \vee \forall xBx$  等价吗?

$\forall$  不对  $\vee$  分配

$\exists$  与  $\wedge$  和  $\vee$  呢?

# 一元谓词逻辑

一元谓词逻辑比三段论 “更多”

■  $\forall x(Ax \wedge Bx)$  与  $\forall xAx \wedge \forall xBx$  等价

$\forall$  可对  $\wedge$  分配

■  $\forall x(Gx \vee Bx)$  与  $\forall xGx \vee \forall xBx$  等价吗?

$\forall$  不对  $\vee$  分配

$\exists$  与  $\wedge$  和  $\vee$  呢?

# 一元谓词逻辑

一元谓词逻辑比三段论 “更多”

■  $\forall x(Ax \wedge Bx)$  与  $\forall xAx \wedge \forall xBx$  等价

$\forall$  可对  $\wedge$  分配

■  $\forall x(Gx \vee Bx)$  与  $\forall xGx \vee \forall xBx$  等价吗?

$\forall$  不对  $\vee$  分配

$\exists$  与  $\wedge$  和  $\vee$  呢?

# 一元谓词逻辑

一元谓词逻辑比三段论 “更多”

■  $\forall x(Ax \wedge Bx)$  与  $\forall xAx \wedge \forall xBx$  等价

$\forall$  可对  $\wedge$  分配

■  $\forall x(Gx \vee Bx)$  与  $\forall xGx \vee \forall xBx$  等价吗?

$\forall$  不对  $\vee$  分配

$\exists$  与  $\wedge$  和  $\vee$  呢?



# 涉及多元谓词的推理

例

所有驴是动物，所有驴头是动物的头

$$\forall x(Dx \rightarrow Ax)$$

---

$$\forall y(Hy \wedge \exists x(Dx \wedge Pxy) \rightarrow \exists z(Az \wedge Pzy))$$

# 涉及多元谓词的推理

例

所有驴是动物，所有驴头是动物的头

$$\forall x(Dx \rightarrow Ax)$$

---

$$\forall y(Hy \wedge \exists x(Dx \wedge Pxy) \rightarrow \exists z(Az \wedge Pzy))$$

# 涉及多元谓词的推理

下面公式是有效的

- $\forall x\forall y\varphi \leftrightarrow \forall y\forall x\varphi$
- $\exists x\forall y\varphi \rightarrow \forall y\exists x\varphi$

其他量词叠置的情况呢?

# 涉及多元谓词的推理

下面公式是有效的

- $\forall x\forall y\varphi \leftrightarrow \forall y\forall x\varphi$
- $\exists x\forall y\varphi \rightarrow \forall y\exists x\varphi$

其他量词叠置的情况呢?

# 谓词逻辑的“情况”或“图像”

- 与命题一样，谓词逻辑的 **有效性** 概念依赖于我们对所涉及的 **情况** 的理解
- 谓词逻辑的表达力更强，其所涉及的情况可以很复杂
- 谓词逻辑的表达力又有限，满足一句话的情况会很多
- 我们需要更抽象的“情况”

# 谓词逻辑的“情况”或“图像”

- 一元谓词逻辑的情况可以抽象为文恩图
- 如果一组一元谓词逻辑公式中只出现  $n$  个谓词，其对应的情况可以用含有  $2^n$  个单间的文恩图来表示
- 一元谓词逻辑公式有效性是可判定的

# 谓词逻辑的“情况”或“图像”


- 人们经常用图片来表示一个具体情况
- 只含有一个二元谓词符号的谓词逻辑公式（集）对应的情况可以用下面定义的数学结构来表示

## 定义 (图)

**图** (graph) 或 **有向图** (directed graph) 由一组 **节点** (vertex, point, node) 和节点之间的 **箭头** (arrow) 组成

# 谓词逻辑的“情况”或“图像”

图：



$Rab$




$Raa$



# 谓词逻辑的“情况”或“图像”

图：




$Rab$



$Raa$

# 谓词逻辑的“情况”或“图像”

图：




$Rab$



$Raa$

# 谓词逻辑的“情况”或“图像”



$$\exists x \exists y Rxy$$

$$\neg \forall x \exists y Rxy$$



$$\exists x Rxx$$

$$\forall x \exists y Rxy$$

# 谓词逻辑的“情况”或“图像”

把下面看作一整个图



$$\exists x \exists y Rxy, \exists x Rxx, \forall x \exists y Rxy$$

# 谓词逻辑的“情况”或“图像”

加一根箭头




$$\forall x(Rxy \rightarrow Ryx)$$

对称性 (symmetry)

我们把满足对称性的图称作 **无向图** (undirected graph)


# 谓词逻辑的“情况”或“图像”

我们可以简化无向图的作图



# 谓词逻辑的“情况”或“图像”

我们可以简化无向图的作图




# 谓词逻辑的“情况”或“图像”

- 我们称满足  $\forall x Rxx$  的图有 **自反性** (reflexivity)
- 满足  $\forall x \forall y \forall z (Rxy \rightarrow Ryz \rightarrow Rxz)$  的图有 **传递性** (transitivity)
- 下面的关系有无自反性、传递性、对称性？人类论域下的“.....的父母”、“.....的祖先”、“.....的兄弟姐妹”



# 谓词逻辑的“情况”或“图像”



是传递的吗？

# 谓词逻辑的“情况”或“图像”



是传递的吗？

# 谓词逻辑的“情况”或“图像”

我们可以在二元谓词的基础上再增加一些符号

- 增加一个等于号

$\forall x \forall y (Rxy \vee Ryx \vee x = y)$  表示  $R$  是 **线性的** (linear)

- 增加一个一元谓词  $P$

$\forall x (Px \rightarrow \exists y (\neg Py \wedge Rxy))$

# 谓词逻辑的“情况”或“图像”

## 例 (家谱)

我们用  $Pxy$  表示  $x$  是  $y$  的父母, 用  $Fx$  表示  $x$  是女性。尝试用谓词逻辑公式表示:

- $x$  是  $y$  的父亲
- Aemma and Viserys are brother and sisters
- Daemon is an uncle of Rhaenyra

1 Aegon the Conqueror

2 Aenys I Targaryen

3 Jaehaerys I Targaryen

Aemon  
Targaryen  
(died)

Daella  
Targaryen

4 Baelon I  
Targaryen

Alyssa  
Targaryen



Rhaenys  
Targaryen

Corlys  
Velaryon

Aemma  
Arryn

5 Viserys I  
Targaryen



Laena  
Velaryon

Laenor  
Velaryon

Rhaenyra  
Targaryen

Daemon  
Targaryen

Alicent  
Hightower

# 谓词逻辑的“情况”或“图像”

## 例 (自然数上的整除关系和素数)



假设论域是自然数集, 我们用  $Dxy$  表示  $x$  整除  $y$

- 用  $\varphi_{=0}(x)$  指代公式  $\forall z Dzx$
- 我们用  $\varphi_{=1}(x)$  指代公式  $\forall z Dxz$
- 考虑公式  $\varphi_P(x) = \forall y (Dyx \rightarrow (\varphi_{=1}(y) \vee y = x))$

在这个意义上, 自然数中的 0、1 和谓词“素数”是“整除”关系 **可定义的**

# 谓词逻辑的“情况”或“图像”

写出一个公式关于左边的图真，右边的图假



## 练习与讨论 8.1

假设论域是《三体》世界中的人物，我们用  $l$  指代罗辑， $z$  指代庄颜， $L$  表示关系“爱”， $R$  表示关系“尊敬”，翻译下面的语句

- 罗辑不被所有人爱
- 罗辑和庄颜彼此尊敬
- 庄颜尊敬每个爱罗辑的人



## 练习与讨论 8.2


自定论域和符号的指代，翻译下面的语句

- 会叫的狗就不咬人
- 张三朋友的朋友也是他的朋友
- 存在最小的自然数
- 子非鱼，安知鱼之乐

## 练习与讨论 8.3

假设论域是人类，翻译下列语句

- 每个男孩都爱白月魁
- 不是所有男孩都爱自己
- 白月魁爱一个爱冉冰的男孩
- 一个爱冉冰的男孩没有男孩或女孩爱

能否给出一个  使得你对上面这些语句的翻译全都成立

## 练习与讨论 8.4

自然数上的整除关系是

- 传递的吗?
- 自反的吗?
- 对称的吗?
- 线性的吗?

## 练习与讨论 8.5

考虑下面的图，我们用  $R_{xy}$  表示有从节点  $x$  到  $y$  的箭头



- $\exists x \forall y R_{xy}$  关于上面的图成立吗？
- 如果成立，为什么？如果不成立，尝试对上面的图做最小的改动使得这个公式成立。

## 练习与讨论 8.6\*

我们用图来表示社交网络，其中  $R_{xy}$  表示  $x$  能联系到  $y$ 。

我们称一个图是 **连接的** (connected)，当且仅当图中任意两个节点之间至少有一个箭头。

- 写出一个谓词逻辑公式，使得满足这个公式的图是连接的
- 我们称图中的一个节点是 **社牛**，当且仅当它可以通过至多两个箭头联系到图中任何一个节点。证明：任何有穷的、自反的、连接的图都有一个社牛
- 无穷的图呢？